

συνιστάται η διακοπή χορήγησης του ανταγωνιστή και η καθυστέρηση της επέμβασης, 12-24 ώρες για το abciximab και 4-6 ώρες για τα Ertifibatide και Tirofiban.

Στην διάρκεια της χορήγησης GPIIb/IIIa αναστολέων θα πρέπει να εξετάζεται ο α-σθενής καθημερινά για την ανεύρεση ενδεχόμενης εστίας αιμορραγίας και να παρα-κοιθουούνται οι αιματοκρίτης και ο αριθμός των αιμοπεταλίων. Η θρομβοπενία είναι μια σπάνια επιπλοκή των φαρμάκων αυτών. Ο μηχανισμός είναι άγνωστος, αλλά μπορεί να οφείλεται είτε σε ταχεία κάθαρση των αιμοπεταλίων ή σε προϋπάρχοντα αντισώματα για το φάρμακο. Θρομβοπενία με αριθμό αιμοπεταλίων κάτω από 50.000/mL παρατηρείται στο 0,5% των ασθενών, ενώ θρομβοπενία, με αριθμό αιμοπεταλίων κάτω από 20.000/mL παρατηρείται σε 0,2% των ασθενών. Η θρομβοπενία είναι αναστρέψιμη και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας.

Μερικές φορές παρατηρείται ψευδοθρομβοπενία που προκαλείται από το EDTA για αυτό πριν από την διακοπή του φαρμάκου θα πρέπει να γίνεται μικροσκοπική εκτίμηση του αριθμού των αιμοπεταλίων.

Κατά τον πρώτο μήνα χορήγησης Abciximab, 5,0% των ασθενών αναπτύσσουν αντι-χιμαϊρικό αντίσωμα. Ανάλογα αντισώματα δεν έχουν παρατηρηθεί μετά από χορήγηση

Ertifibatide και Tirofiban. Σε περίπτωση επαναχορήγησης δεν έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις υπερευαισθησίας ή αναφυλακτοειδούς αντίδρασης.

#### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ασπιρίνη λόγω της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και του χαμηλού κόστους ενδείκνυται παντού όπου είναι ανεκτή.

Η κλιπιδογρέλη είναι ασφαλέστερη, καλύτερα ανεκτή με πρακτικότερο δοσολογικό σχήμα και φθνότερη της τικλοπιδίνης

Το συγκριτικά ευνοϊκότερο αιματολογικό προφίλ της κλιπιδογρέλης καθιστά πιο πιθανή την δική της εκλογή για μακροπρόθεσμη χρήση στη δευτερογενή πρόληψη σε σχέση με την τικλοπιδίνη. Αποτελεί το εναλλακτικό φάρμακο όπου η ασπιρίνη αντε-δείκνυται. Η εφαρμογή των ανταγωνιστών του υποδοχέα GPIIb/IIIa αποτελεί πρόκληση για το μέλλον. Η από του στόματος χορήγηση των παραγόντων αυτών δεν έδειξε οφέλη.

Περαιτέρω μελέτες θα ανακαθορίσουν το ιδανικό αντιαιμοπεταλιακό σχήμα με τις λιγότερες παρενέργειες, που μελλοντικά θα συνδυασθεί και με γενετική καθοδήγηση.

**xeforapid**  
lornoxicam



**“...τόσο γρήγορο στη δράση του όσο μία ένεση...”**

Παράδειγμα: Ηλικία 65 ετών, Άρτηρική υπέρταση, Διαβήτης, Σύνδρομο Coronary Artery Disease

**γιατί ο πόνος... δεν μπορεί να περιμένει**

NYCOMED

NYCOMED ITALIA S.p.A.  
Α. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ Ε.Ε. 21 ΚΑΡΑΓΕΩΡ  
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡ 80 - 849 45 ΠΕΡΙΣΣΩΝ  
ΤΗΛ.: 02 9 87080  
e-mail: info@nycomed.it  
http://www.nycomed.it

We improve healthcare

**GYNOSANT**<sup>®</sup>  
Fluconazole

Εύστοχη επιλογή  
στη θεραπεία  
των μυκητιασικών  
λοιμώξεων



**GYNOSANT<sup>®</sup> 100mg**  
Fluconazole

**GYNOSANT<sup>®</sup> 150mg**  
Fluconazole

**GYNOSANT<sup>®</sup> 150mg**  
Fluconazole

**png gerolymatos**  
health | beauty | care

**Π.Ν.Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ**  
Αθήνα: Ασκληπιού 13, 145 68 Κρυονέρι Αττικής, Τηλ.: 2108161107-108,  
Οεο/νίκυ: Ι. Κωλέττη 25Δ & Δημοκρατίας, Τηλ.: 2310 634510,  
Web Site: www.gerolymatos.gr, email: pharmaceuticals@gerolymatos.gr